



ΧΗΜΕΙΑ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
27 ΜΑΪΟΥ 2015
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α


A1. $\rightarrow \gamma$, A2. $\rightarrow \beta$, A3. $\rightarrow \gamma$, A4. $\rightarrow \alpha$, A5. $\rightarrow \beta$.

ΘΕΜΑ Β


B1. α) Λάθος




Με προσθήκη διαλύματος ισχυρής βάσης αυξάγονται ταυτόχρονα τα mol OH^- , λόγω διάστασης της ισχυρής βάσης, αλλά και ο όγκος του διαλύματος. Οπότε δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν η συγκέντρωση $[OH^-]$ στο διάλυμα αυξάνεται ή ελαττώνεται. Συνεπώς το pH του διαλύματος αυξάνεται ή ελαττώνεται με την αντίστοιχη αύξηση ή ελάττωση της $[OH^-]$.



Με διάλυμα $CuCl/NH_3$ αντιδρά το 1-βουτίνιο και σχηματίζεται καστανέρυθρο ίζημα.



γ) Σωστό
 Στο διάλυμα περιέχεται ένα ασθενές οξύ, το CH_3COOH , και η συζυγής του βάση, η CH_3COO^- , η οποία προέρχεται από την διάσταση του άλατος CH_3COONa , με ίσες συγκεντρώσεις.



Η παρουσία του άλατος NaCl ($\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$) δεν επηρεάζει τα συστατικά του διαλύματος, διότι δεν αντιδρά με αυτά.
Συνεπώς το διάλυμα είναι ρυθμιστικό.

δ. → Λάθος

Το πρώτο ευγενές αέριο είναι στοιχείο πρώτης περιόδου με διαμόρφωση $K: 1s^2$.

ε. → Λάθος

Η CH_3OH όπως και όλες οι αλκοόλες ανήκει στους δότες πρωτονίων (οξεακατά Brönsted – Lowry).

Η σχετική της όμως ισχύ ως προς το H_2O είναι μικρή (K_{aROH} από 10^{-16} έως 10^{-18} στους 25°C).

Συνεπώς μπορούμε να θεωρήσουμε πως «πρακτικά» δεν ιοντίζεται με το H_2O ή ακριβέστερα πως η ισορροπία του ιοντισμού της με το H_2O είναι μετατοπισμένος αριστερά.

Άρα η πρόταση είναι Λάθος.

- B2.** **a.** ${}_7\text{X} : 1s^2, 2s^2, 2p^3$
 ${}_{12}\Psi : 1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2$
 ${}_8\text{O} : 1s^2, 2s^2, 2p^4$
 ${}_1\text{H} : 1s^1$


Άρα το X 2η περίοδο, 15η ομάδα
Ψ 3η περίοδο, 2η ομάδα.

- b.** Το Ψ έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα από το X γιατί έχει μία στοιβάδα περισσότερη.

Ψ: 3η περίοδο
X: 2η περίοδο
άρα $R_\Psi > R_X$

και $E_{i\Psi} < E_{iX}$ γιατί όσο μεγαλώνει τη ατομική ακτίνα, μεγαλώνει η ηλεκτροθετικότητα άρα μικραίνει η ενέργεια ιοντισμού.

γ.




ΘΕΜΑ Γ

Γ1.


- (A) $CH \equiv CH$
 (B) $\begin{matrix} \text{CH}_3 - \text{CH} \\ || \\ \text{O} \end{matrix}$
 (Γ) $CH_3 - COOH$
 (Δ) CH_3COONa
 (Ε) $CH_3 - CH_2 - OH$
 (Ζ) $\begin{matrix} \text{CH}_3 - \text{CH}_2 \\ | \\ \text{Cl} \end{matrix}$
 (Θ) $\begin{matrix} \text{CH}_3 - \text{CH}_2 \\ | \\ \text{MgCl} \end{matrix}$
 (Κ) $\begin{matrix} \text{CH}_3 - \text{CH} \\ | \\ \text{OMgCl} \end{matrix} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
 (Λ) $\begin{matrix} \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} \\ | \\ \text{OH} \end{math} - \text{CH}_3$
 (Μ) $\begin{matrix} \text{CH}_3 - \text{COO} - \text{CH} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{matrix} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$

Γ2. α) Από τα 2 ισομερή του βουτενίου, τα οποία διαθέτουν ευθύγραμμη αλυσίδα δηλ το 1 και 2 βουτένιο μόνο το 1-βουτένιο οδηγεί με προσθήκη H_2O , σε 2 διαφορετικά προϊόντα (Β) και (Γ).

Γιατί




Αποκλειστικό προϊόν



β) Εστω $n_{ΟΛΙΚΑ} = \varphi_{mol}$ και από αυτά τα x_{mol} μετατρέπονται στην (Β), ενώ y_{mol} μετατρέπονται στην (Γ) αλκοόλη. Επομένως $\varphi = x + y$ (1)

1^o(ΙΣΟ) μέρος: Υπάρχουν $\frac{x}{3}$ mol (B) και $\frac{y}{3}$ mol (Γ)

και οι 2 αλκοόλες αντιδρούν με Na.




$$\frac{\Phi}{3} = \frac{x+y}{3} \text{ mol} \quad ? = \frac{\Phi}{6} \text{ mol}$$

$$n_{H_2} = \frac{V}{22,4} = \frac{1,12}{22,4} = 0,05 \text{ mol} \Rightarrow \frac{\Phi}{6} = 0,05 \Rightarrow \Phi = 0,3 \text{ mol} \quad (2)$$

2ο (ΙΣΟ) Μέρος Μόνο η B αλκοόλη «δίνει» την αλογονοφορμική αντιδράση.

Επομένως



x/3 mol

? = x/3 mol

$$nCHI_3 = 0,08 \Rightarrow 0,08 = \frac{x}{3} \Rightarrow x = 0,24 \text{ mol}$$


$$(1) \Rightarrow y = 0,06 \text{ mol}$$

3ο (ΙΣΟ) Μέρος

H (Γ) οξειδώνεται προς οξύ (1^o ταγής ROH)


H (B) οξειδώνεται προς κετόνη (2ο ταγής ROH)

(Γ)



$$n_{KMnO_4} = \frac{4 \cdot 0,02}{5} = \frac{0,08}{5} \text{ mol} \quad KMnO_4 \text{ καταναλώνονται στη (Γ).}$$

(B)



$$\frac{x}{3} = 0,08 \text{ mol} \quad = ?$$

$$? = \frac{0,16}{5} \quad \text{mol } KMnO_4 \text{ καταναλώθηκαν στην οξείδωση της (B)} \quad (3)$$

$$\text{Από τις (2) και (3)} \Rightarrow n_{Oλικά KMnO_4} = \frac{0,08}{5} + \frac{0,16}{5} = \frac{0,24}{5} \text{ mol}$$

$$C_{KMnO_4} = \frac{n}{V} \Rightarrow V_{(\delta_{\text{ιαλύματος}}) KMnO_4} = \frac{\frac{0,24}{5}}{0,1} = \frac{2,4}{5} = 0,48 \text{ L διαλύματος } KMnO_4.$$

ΘΕΜΑ Δ

Δ1.


$\omega \text{ L στο Y3}$
 1 L στο Y1

pH = 4

$$V_{\delta_{\text{ιαλύματος}}} = (1 + \omega)L$$

$$n_{NaOH} = C \cdot V = 0,1 \cdot \omega \text{ mol / } n_{HCOOH} = C \cdot V = 0,1 \cdot 1 = 0,1 \text{ mol}$$


To HCOOH αντιδρά με το NaOH:



Διερεύνηση:

a) $n_{HCOOH} = n_{NaOH}$

Τελικό διάλυμα : HCOONa




$Na^+ / NaOH$: ισχυρή

$HCOO^- + H_2O \rightleftharpoons HCOOH + OH^-$, pH > 7 μη δεκτό.

β) $n_{HCOOH} < n_{NaOH}$

Τελικό διάλυμα : NaOH, HCOONa, pH > 7

γ) $n_{HCOOH} > n_{NaOH}$



0,1	0,1ω
0,1ω	0,1ω
0,1 - 0,1ω	--

Αρχικά (mol)
 Αντιδρούν
 Παράγονται
 Τελικά

Τελικά:

$$\left. \begin{aligned} C_{HCOONa} &= \frac{n}{V} = \frac{0,1\omega}{1+\omega} M \\ C_{HCOOH} &= \frac{n}{V} = \frac{0,1\omega}{1+\omega} M \end{aligned} \right\} \text{Ρυθμιστικό}$$

$$\text{Ισχύει: } pH = pK_a + \log \frac{[HCOO^-]}{[HCOOH]} \Rightarrow 4 = 4 + \log \frac{\frac{0,1\omega}{1+\omega}}{0,1 - 0,1\omega} \Rightarrow 1 = \frac{0,1\omega}{0,1 - 0,1\omega} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 0,1 - 0,1\omega = 0,1\omega \Rightarrow 0,1 = 0,2\omega \Rightarrow \omega = 0,5 \text{ L / 500 ml} \quad \text{Y3.}$$

Δ2.

500ml δτος Y₁

500ml δτος Y₂


$\frac{Y_1}{Y_2} \quad \text{pH} = 2$

$$V_{\text{δτος}} = 500 + 500 = 1000 \text{ mL / 1L}$$

$$C_{\text{HCOOH}} = \frac{n}{V} = \frac{0,1 \cdot 0,5}{1} = 0,05 \text{ M}$$

$$C_{\text{CH}_3\text{COOH}} = \frac{n}{V} = \frac{1 \cdot 0,5}{1} = 0,5 \text{ M}$$

Τα οξέα ιοντίζονται:



$$\text{Όμως } [\text{H}_3\text{O}^+] = (x + y)M$$

$$\text{ισχύει: } K_a = \frac{[\text{HCOO}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HCOOH}]} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 10^{-4} = \frac{x(x+y)}{0,05-x} \Rightarrow 10^{-4} \approx \frac{x(x+y)}{0,05} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 5 \cdot 10^{-6} = x(x+y) \quad (1)$$

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} \Rightarrow 10^{-5} = \frac{y(x+y)}{0,5-y} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 10^{-5} \approx \frac{y(x+y)}{0,5} \Rightarrow 5 \cdot 10^{-6} = y(x+y) \quad (2)$$

$$(1) + (2) \Rightarrow 2 \cdot 5 \cdot 10^{-6} = x(x+y) + y(x+y) \Rightarrow$$



$$\Rightarrow 10^{-5} = (x+y)(x+y) \Rightarrow (x+y) = [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-35} \text{ M}$$

$$\text{pH} = 2,5$$

Δ3. $n_{\text{HCOOH}} = C \cdot V = 0,1 \cdot 0,5 = 0,05 \text{ mol}$

$$n_{\text{CH}_3\text{COOH}} = C \cdot V = 1 \cdot 0,5 = 0,5 \text{ mol}$$

Τα οξέα αντιδρούν με το Mg:




$$n_{\text{H}_2} = 0,025 \text{ mol} / V_{\text{H}_2} = n \cdot V = 0,025 \cdot 22,4 = 0,56 \text{ L}$$

$$n_{\text{H}_2} = 0,25 \text{ mol} / V_{\text{H}_2} = n \cdot V = 0,25 \cdot 22,4 = 5,6 \text{ L}$$

$$V_{\text{oξH}_2} = 0,56 + 5,6 = 6,16 \text{ L}$$

Δ4. Είναι δυνατός ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης του διαλύματος HCOOH καθώς μπορούμε να βασιστούμε στη στοιχειομετρία της εξισωσης του HCOOH από το KMnO₄:



Δεν απαιτείται δείκτης γιατί ο προσδιορισμός του τελικού σημείου θα γίνει από τη στιγμή που θα σταματήσει ο αποχρωματισμός του διαλύματος KMnO₄/H⁺ (μωβ) καθώς το διάλυμα προστίθεται σταδιακά στο διάλυμα HCOOH.

Δηλαδή η πρώτη σταγόνα που δεν θα αποχρωματιστεί θα καθορίσει το τελικό σημείο της ογκομέτρησης